

Výchozí blok otázek

Vážený pane / Vážená paní,

následující dotazník je součástí výzkumného projektu zaměřeného na používání odčervovacích přípravků v evropském mlékárenském průmyslu. Jelikož chceme zjistit **Váš osobní názor** na toto používání, neexistují žádné správné ani nesprávné odpovědi. Je však velmi důležité vyplnit tento dotazník co nejupřímněji a nejúplněji, protože každý jednotlivý názor je pro nás důležitý. Odpovědi jsou zpracovávány zcela anonymně a do databáze nebudou zahrnuty žádné osobní údaje. Vyplnění dotazníku vám zabere pouze 10 minut.

Předem vám děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku!

Kolik dojnic chováte?

Kolik měsíců se váš skot pase na pastvinách?

	0	1	2	4	5	6	7	8	10	11	12
Dojnice											
Mladý skot											

Setkáváte se u svého skotu s problémy způsobenými parazitárními infekcemi?

☐ Nikdy
 ☐ Velmi zřídka
 ☐ Zřídka
 ☐ Trochu
 ☐ Občas
 ☐ Velmi často
 ☐ Vždy

Myslíte si, že infekce „červy“ představují na vaší farmě závažný problém?

☐ Vůbec ne závažný
 ☐ Není závažný
 ☐ Spíše ne
 ☐ Neutrální
 ☐ Spíše závažný
 ☐ Závažný
 ☐ Velmi závažný

Kolikrát ročně je váš skot ošetřován proti parazitům?

	0	1	2	3	4	5	6	7
Dojnice								
Mladý skot								

Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními

	Rozhodně nesouhlasím	Nesouhlasím	Mírně nesouhlasím	Neutrální	Mírně souhlasím	Souhlasím	Plně souhlasím
Vždy používám stejnou léčbu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Necítím potřebu měnit svou současnou léčbu	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	Velmi nesouhlasím	Nesouhlasím	Mírně nesouhlasím	Neutrální	Mírně souhlasím	Souhlasím	Silně souhlasím
Léčba, kterou v současné době praktikuji, je standardní postup, který vždy používám	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Kdo je podle vás zodpovědný za **rozhodnutí** o léčbě červů na vaší farmě?

	Vůbec nejsem zodpovědný	Není zodpovědný	Spíše nenesu odpovědnost	Neutrální	Spíše zodpovědný	Zodpovědný	Velmi zodpovědný
Já sám (zemědělec)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Můj veterinář	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Jiný							

Zaškrtněte prosím políčko u každé z následujících možností, podle intenzity významu, jaký cítíte

Podle mého názoru je používání odčervovacích přípravků k prevenci infekcí červy na mé farmě...

Špatné	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Dobré
Zbytečné	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Užitečné
Škodlivé	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Prospěšné

Používáte na své farmě nějakou formu diagnostiky k detekci infekcí parazity?

	Nikdy	Zkusil jsem to jednou	Zkoušel jsem to vícekrát	Když tuším problémy	Každý rok
Analýza trusu	☐	☐	☐	☐	☐
Analýza mléka	☐	☐	☐	☐	☐
Krevní test	☐	☐	☐	☐	☐

Kdo je podle vás zodpovědný za vyžádání diagnostiky parazitů na vaší farmě?

	Vůbec není zodpovědný	Není zodpovědný	Spíše není zodpovědný	Neutrální	Spíše zodpovědný	Zodpovědný	Velmi zodpovědný
Já sám (zemědělec)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Můj veterinář	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Jiný							

Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními

	Rozhodně nesouhlasím	Nesouhlasím	Mírně nesouhlasím	Neutrální	Mírně souhlasím	Souhlasím	Plně souhlasím
Rozhodnutí o použití diagnostiky červů na mé farmě je v mé pravomoci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Můžu snadno nařídit diagnostiku na mé farmě	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Diagnostiku mohu provést, kdykoli chci	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními

	Rozhodně nesouhlasím	Nesouhlasím	Mírně nesouhlasím	Neutrální	Mírně souhlasím	Souhlasím	Plně souhlasím
V budoucnu hodlám provést diagnostiku před použitím odčervovacích přípravků	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chci provést diagnostiku před preventivním použitím odčervovacích přípravků na mé farmě	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mám v úmyslu provést diagnostiku předtím, než začnu léčit svá zvířata odčervovacími přípravky	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Zaškrtněte prosím políčko u každé z následujících možností, podle intenzity významu, jaký cítíte

Podle mého názoru je stanovení diagnózy před léčbou zvířat odčervovacími přípravky...

Špatné	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Dobré
Zbytečné	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Užitečné
Škodlivé	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Prospěšné

Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními

	Silně nesouhlasím	Nesouhlasím	Mírně nesouhlasím	Neutrální	Mírně souhlasím	Souhlasím	Silně souhlasím
Většina zemědělců provádí diagnostiku před odčervováním na svých farmách	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Lidé, na kterých mi záleží, si myslí, že bych měl provést diagnostiku před použitím odčervovacích přípravků na své farmě	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Většina mých kolegů provádí diagnostiku před preventivním podáním odčervovacích přípravků	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Očekává se ode mě, že před léčbou provedu diagnostiku	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Cítím společenský tlak, abych provedl diagnostiku před použitím odčervovacích přípravků na své farmě	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ostatní zemědělci mají pozitivní názor na diagnostiku k měření parazitárních infekcí	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Je pro mě důležité, aby i moji kolegové farmáři provedli diagnostiku před použitím odčervovacích přípravků na svých farmách	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními

	Velmi nesouhlasím	Nesouhlasím	Mírně nesouhlasím	Neutrální	Mírně souhlasím	Souhlasím	Silně souhlasím
V současné době vím o červích a odčervování dost na to, abych mohl rozhodnout o vhodném programu proti červům na své farmě	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Mám k dispozici dostatek informací, na jejichž základě mohu rozhodnout o vhodném programu proti červům na mé farmě	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vím, k čemu slouží diagnostika parazitů	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Znám omezení diagnostiky parazitů	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
(tj. co vám nemohou sdělit)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Umím interpretovat výsledky diagnostiky a na základě těchto informací jednat s pomocí veterináře/poradce	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Umím interpretovat výsledky diagnostiky a na základě těchto informací jednat sám	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Níže vám poskytujeme další informace o přípravcích proti parazitům. Přečtěte si prosím následující text pozorně:

Přípravky proti červům se na farmách používají hlavně preventivně, aby se výskyt infekcí červy udržel na co nejnižší úrovni. Obvykle se neprovádí diagnostika k zjištění skutečné míry infekce červy. Výzkumy však ukázaly, že časté používání těchto přípravků může vést k rezistenci. V Evropě se rezistence vůči přípravkům proti červům již objevila v několika zemích. Rezistence způsobuje, že přípravky proti červům ztrácejí svůj účinek, což má negativní dopad jak na zdraví, tak na produktivitu vašich krav.

Tento typ rezistence se vyskytuje u červů, nikoli u skotu samotného. Nejúčinnějším řešením je proto **diagnostikovat váš skot** a následně **upravit používání odčervovacích přípravků** v závislosti na výsledcích. Existují různé způsoby, jak diagnostikovat váš skot: prostřednictvím analýzy trusu, mléka nebo krve. Požádejte svého veterináře o vhodný test pro vaši farmu.

Uveďte, do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními

	Silně nesouhlasím	Nesouhlasím	Mírně nesouhlasím	Neutrální	Mírně souhlasím	Souhlasím	Plně souhlasím
Rezistence na antihelmintika představuje vážnou hrozbu pro zdraví zvířat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Je pravděpodobné, že se u červů na mé farmě vyvine rezistence na antihelmintika	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

	Rozhodně nesouhlasím	Nesouhlasím	Mírně nesouhlasím	Neutrální	Mírně Souhlasím	Souhlasím	Plně souhlasím
Rezistence na antihelmintika představuje vážné ohrožení zdraví zvířat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Červi na mé farmě jsou ohroženi rozvojem rezistence vůči antihelmintikům	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Rezistence vůči antihelmintikům představuje významnou hrozbu pro zdraví zvířat	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Je pravděpodobné, že červi na mé farmě si vyvinou rezistenci vůči antihelmintikům	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

[Demografické údaje](#)

- ☐ muž
- ☐ žena

[Jaký je váš věk?](#)[Kolik let zkušeností máte v mlékárenském průmyslu?](#)